

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Tseysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg harde capsules <div>tegafur/gimeracil/oteracil</div>

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

- Wat is Teysuno en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
- Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
- Hoe gebruikt u dit middel?
- Mogelijke bijwerkingen
- Hoe bewaart u dit middel?
- Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Teysuno en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Teysuno bevat de werkzame stoffen tegafur, gimeracil en oteracil. Teysuno behoort tot de klasse geneesmiddelen van de fluoropyrimidines, ook wel 'antineoplastische middelen' genoemd, die de groei van kankerwekken stoppen.

Teysuno wordt voorgeschreven door de arts voor

- de behandeling van volwassenen met gevorderde (maag)kanker, samen met cisplatine, een ander middel tegen kanker.
- de behandeling van uitgezaaide (gemetastaseerde) kanker van de dikke darm en de endeldarm, waarbij het niet mogelijk is om door te gaan met een ander fluoropyrimidine (een middel tegen kanker uit dezelfde klasse als Teysuno) door bijwerkingen aan de huid van de handen en voeten (hand-voetsyndroom) of aan het hart. Bij deze patiënten wordt Teysuno alleen of in combinatie met andere middelen tegen kanker gebruikt.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

- Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**
- u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 - u gebruikt andere geneesmiddelen tegen kanker van de klasse fluoropyrimidines, zoals fluorouracil en capecitabine, of u heeft ernstige en onverwachte reacties op fluoropyrimidines gehad
 - u weet dat u geen activiteit van het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) (totale DPD-deficiëntie) heeft
 - u bent zwanger of u geeft borstvoeding
 - u heeft ernstige bloedafwijkingen
 - u heeft nierproblemen waarvoor dialyse noodzakelijk is
 - u wordt momenteel behandeld of u bent in de afgelopen 4 weken behandeld met brivudine als onderdeel van de behandeling van herpes zoster-infectie (waterpokken of gordelroos)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt als u:

- aandoeningen van het bloed heeft;
- een nierandoening heeft.
- maag- en/of darmproblemen heeft, zoals pijn, diarree, braken en uitdroging (dehydratie),
- oogafwijkingen heeft, zoals droge ogen of verhoogde traanafscheiding;
- een bestaande of eerdere infectie van de lever met het hepatitis B-virus heeft, omdat uw arts u mogelijk extra wil controleren;
- weet dat u een gedeeltelijke deficiëntie (gebrek) heeft van de activiteit van het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD);
- een familielid heeft dat een gedeeltelijke of totale deficiëntie heeft van het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).

DPD-deficiëntie: DPD-deficiëntie is een genetische aandoening die meestal niet wordt geassocieerd met gezondheidsproblemen behalve als u bepaalde medicijnen gebruikt. Wanneer u DPD-deficiëntie heeft en Teysuno gebruikt, heeft u een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen (die in rubriek 4 'Mogelijke bijwerkingen' staan). Het wordt aanbevolen om u voor het begin van de behandeling te laten testen op DPD-deficiëntie. Als u geen activiteit van het enzym heeft, mag u Teysuno niet gebruiken. Als u een verlaagde enzymactiviteit (gedeeltelijke deficiëntie) heeft, kan uw arts een verlaagde dosis voorschrijven. Als u negatieve testresultaten voor DPD-deficiëntie heeft, kunnen nog steeds ernstige en levensbedreigende bijwerkingen optreden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Teysuno wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Teysuno nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

U mag brivudine (een anti-viraal geneesmiddel voor de behandeling van gordelroos of waterpokken) niet gelijktijdig met Teysuno gebruiken (inclusief de rustperiode waarin geen Teysuno capsules worden ingenomen).

Als u brivudine heeft genomen, moet u ten minste 4 weken wachten na het stoppen met brivudine voordat u kunt beginnen met het innemen van Teysuno. Zie ook de rubriek "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?".

Ook moet u met name voorzichtig zijn als u een van de volgende middelen gebruikt:

- andere geneesmiddelen op basis van fluoropyrimidine, zoals het antischimmelmiddel flucytosine. Teysuno kan niet worden vervangen door andere orale geneesmiddelen op basis van fluoropyrimidine

- Om misselijkheid en braken te verlichten:
 - o Ga liggen of adem diep in en uit als u zich misselijk voelt
 - o Vermijd strakke kleding

- **Lage aantallen rode bloedcellen** die leiden tot bloedarmoede

- U kunt verschijnselen zoals koude handen en voeten krijgen, bleek zien, zich licht in het hoofd voelen, vermoeidheid en kortademigheid ervaren.
- Als u een van bovenstaande symptomen heeft, werk dan niet te hard en zorg dat u voldoende slaap en rust krijgt.

- **Lage aantallen witte bloedcellen** die leiden tot een verhoogd risico op ernstige plaatselijke infecties (bijv. in de mond, longen of urinewegen) of tot bloedinfecties

- U kunt symptomen ervaren als koorts, rillingen, hoesten, pijnlijke keel.
- Als u 38,5 °C koorts of hoger heeft, **stop dan met het innemen van Teysuno en neem onmiddellijk contact op met uw arts.**
- Ter voorkoming van infecties kunt u het beste drukke plaatsen vermijden, bij thuiskomst gorgelen en uw handen vóór de maaltijd en na toiletbezoek wassen.

- **Lage aantallen bloedplaatjes** die leiden tot een verhoogde kans op bloedingen

• Als u bloedingen in de huid, mond (door het tandenpoetsen), neus, luchtwegen, darm, magen, darmen, enz. heeft, **stop dan met het innemen van Teysuno en neem onmiddellijk contact op met uw arts.**

• Om bloedingen te voorkomen, moet u niet te hard werken of te intensief sporten om letsel en blauwe plekken te voorkomen.

• Draag losse kleding om de huid te beschermen. Poets uw tanden en snuit uw neus voorzichtig.

- **Verlies van eetlust (anorexie)** kan leiden tot gewichtsverlies en uitdroging
 - U kunt uitgedroogd raken als u niet voldoende eet en/of niet voldoende water drinkt.
 - Als u uitgedroogd raakt, kunt u verschijnselen van droge mond, zwakte, droge huid, duizeligheid en krampen krijgen.
 - Probeer vaak kleine maaltijden te nemen. Vermijd vet en sterk ruikend voedsel. Ga door met zoveel eten als u kunt, zelfs als u geen honger heeft, om een goede voedingstoestand te behouden.
- Als u vermoeid bent, koorts heeft en gebrek aan eetlust, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

- **Zenuwandoening:** u kunt een doof gevoel, tintelen, pijn, vreemd gevoel, zwakke spieren, trillen of bewegingsproblemen ervaren.

- **Zwakte en vermoeidheid,** dit kunnen bijwerkingen zijn van andere medicijnen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 tot 10 of 100 personen):

- **Zenuw:** hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid,

- **Oog:** oogproblemen, ongemak door meer of minder tranenvloed, problemen met zien, ernstige aandoening met blaarvorming van de ogen, waarbij de 'opervlaktheid' van het oog door slijtage verdwijnt (cornea-erosie).

- **Oor:** gehoorproblemen

- **Bloedvaten:** hoge of lage bloeddruk, bloedpropjes in het been en de long

- **Longen en neusdorang:** kortademigheid, hoesten

- **Ingewanden en mond:** droge mond, zweren in de mond, keel en slokdarm, de hik, buikpijn, indigestie, maag- of darmontsteking, perforatie van de maag, dunne darm en dikke darm.

- **Lever:** gele ogen en huid, veranderingen in uitslagen van bloedonderzoeken die aantonen hoe de lever werkt

- **Huid:** haaruitval, jeuk, uitslag (of dermatitis, huidreactie), droge huid, hand- en voetractie (pijn, zwelling en roodheid van handen en/of voeten), pigmentvlekken

- **Nier:** verlaagd urinevolume, veranderingen in de uitslagen van bloedonderzoeken naar de nierfunctie, nierfunctiestoornis en nierfalen

- **Overig:** koele rillingen, gewichtsafname, zwelling in specifieke gebieden en spier/botpijn

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 tot 10 op de 1.000 personen):

- **Geestelijk:** zien en horen van dingen die er niet zijn, persoonlijkheidsverandering, niet stil kunnen zitten, verwardheid, nervositeit, depressie, seksueel niet goed functioneren

- **Zenuw:** stemafwijkingen, niet kunnen spreken en woorden niet kunnen begrijpen, geheugenproblemen, onzekere gae, evenwichtsproblemen, eenzijdige lichaamszwakte, slapigheid, zenuwontsteking, veranderde reukzin, niet goed functioneren van de hersenen, flauwvallen, bewustzijnsverlies, beroerte, toevallen,

- **Oog:** jeukende en rode ogen, allergische reactie in de ogen, hangend bovenste ooglid

- **Oor:** draaierigheid, dichtzitende oor, zurende oorpijn

- **Hart:** onregelmatige of snelle hartslag, pijn op de borst, ophoping van overmatig vocht rond het hart, hartaanval, hartfalen

- **Bloedvaten:** ontsteking van een ader, opvliegers

- **Longen en neusdorang:** loopneus, stemafwijking, neusverstopping, rode keel (faryngeaal erytheem), hooikoorts

- **Ingewanden en mond:** brandend maagzuur (gastro-oesofageale reflux), verhoogde speekselafscheiding, overmatig oprispen en boeren, lipontsteking, maag-darmafwijkingen, pijn in mond, ongewone samentrekkingen van de spieren van de slokdarm, blokkade in de maag en darm, maagzweer, wondkanker, bindweefsel achter het buikwies (retroperitoneale fibrose), krakende en gemakkelijk barstende tanden en kiezen, moeite met slikken, afwijking van de speekselklier, ambeien

- **Huid:** verlies van huidkleur, vervellen, overmatige lichaamsbeharng, krimpen van de nagels, overmatig transpireren

- **Algemeen:** algemene achteruitgang van de conditie, gewichtstoename, roodheid en zwelling op de injectieplaats, kankergelateerde pijn en bloeding, multigaanfalen

- **Veranderingen in uitslagen van bloedonderzoeken:** hoge waarden voor bloedsuiker, hoge waarden voor bloedlipiden, verandering van bloedstollingstijd, hoge aantallen bloedcellen, lage of hoge eiwitgehalten

- **Overig:** vaak plassen, bloed in urine, nekpijn, rugpijn, pijn in de borst, strakke spieren of spierkramp, zwelling van gewrichten, zurende pijn in de ledematen, spierzwakte, gewrichtsontsteking en gewrichtspijn

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 tot 10 op de 10.000 personen) en zeer zelden voorkomde bijwerkingen (kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 personen):

- acuut leverfalen
- infectie van de alvleesklier
- spierafbraak
- verlies van reukvermogen
- zonnallergie
- bloedpropjes en bloedingen, verspreid over een groot deel van het lichaam
- ziekte die de witte stof in de hersenen aantast
- ernstige ziekte met blaarvorming van de huid, mond en geslachtsorganen
- opnieuw optreden van hepatitis B-virusinfectie (reactivatie) als u ooit hepatitis B (een leverinfectie) heeft gehad

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Krijgt u veel last van een bijwerking, stop dan met het gebruik van Teysuno en vertel dit onmiddellijk aan uw arts.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Galilleelaan 5/03
1210 Brussel
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

- Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenste doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

- Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

- Gebruik geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en spoel ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn tegafur, gimeracil en oteracil. Elke harde capsule bevat 20 mg tegafur, 5,8 mg gimeracil en 15,8 mg oteracil (als monokalium).

- De andere stoffen in dit middel zijn:

- Inhoud capsule: lactose-monohydraat, magnesiumstearaat
- Omhulsel capsule: gelatine, titaniumdioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, taak
- Inkt: rood ijzeroxide (E172), Indigokarmijn (E132), carnaubawas, gebleekte schellak, glycerylmono-oleaat

Hoe ziet Teysuno eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De capsule heeft een opmaak-witte body en een witte dop waarin in grijs «T442» is gedrukt en wordt geleverd in blisterverpakkingen van elk 14 capsules.

Elke verpakking bevat 42 capsules of 84 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Nordic Group B.V.
Siriusdreef 41
2132 WT Hoofddorp
Nederland

Fabrikant
Millmont Healthcare Limited
Block7, City North
Business Campus, Stamullen
Co. Meath, K32 YD60
Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België
Nordic Pharma
Tel: +32 (0)3 820 5224
info@nordicpharma.be

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2022

Andere informatiebronnen
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: <http://www.ema.europa.eu>.

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER
Tseysuno 20 mg/5.8 mg/15.8 mg hard capsules <div>tegafur/gimeracil/oteracil</div>

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
– Keep this leaflet. You may need to read it again.

– If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

– This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

– If you get any side effects, talk to your doctor. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:

- What Teysuno is and what it is used for
- What you need to know before you take Teysuno
- How to take Teysuno
- Possible side effects
- How to store Teysuno
- Contents of the pack and other information

1. What is teysuno and what is it used for

Teysuno contains the active substances tegafur, gimeracil and oteracil.

Teysuno belongs to the fluoropyrimidine class of medicines known as "antineoplastic agents" which stop the growth of cancer cells. Teysuno is prescribed by doctors for:

– The treatment of adults with advanced stomach (gastric) cancer and is taken with cisplatin, another anti-cancer medicine.
– The treatment of cancer of the large intestines and rectum which has spread (metastasized) and where it is not possible to continue with another fluoropyrimidine (anti-cancer treatments from the same group of medicines as Teysuno) due to side effects on the skin of hands or feet (hand-foot syndrome) or on the heart. In these patients, Teysuno is used alone or in combination with other anticancer medicines.

2. What you need to know before you take Teysuno

Do not take Teysuno if you:

- are allergic to tegafur, gimeracil, oteracil or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).
- are taking other fluoropyrimidine anti-cancer medicine such as fluorouracil and capecitabine, or have had severe and unexpected reactions to fluoropyrimidines
- know that you do not have any activity of the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) (complete DPD deficiency)
- are pregnant or breast-feeding
- have severe blood disorders
- have kidney disease requiring dialysis
- are being treated now or have been treated in the last 4 weeks with brivudine as part of herpes zoster (chickenpox or shingles) therapy.

– eye disorders, such as "dry eyes" or increased tearing
– a current or previous infection of the liver with the hepatitis B virus, since your doctor may want to monitor you more closely
– a partial deficiency in the activity of the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)
– a family member who has partial or complete deficiency of the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)

Warnings and precautions

Talk to your doctor before taking Teysuno if you have:

- blood disorders
- kidney disease
- stomach and/or bowel problems such as pain, diarrhoea, vomiting and dehydration
- eye disorders, such as "dry eyes" or increased tearing
- a current or previous infection of the liver with the hepatitis B virus, since your doctor may want to monitor you more closely
- a partial deficiency in the activity of the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)
- a family member who has partial or complete deficiency of the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)

DPD deficiency: DPD deficiency is a genetic condition that is not usually associated with health problems unless you receive certain medicines. If you have DPD deficiency and take Teysuno, you are at an increased risk of severe side effects (listed under section 4 Possible side effects). It is recommended to test you for DPD deficiency before start of treatment. If you have no activity of the enzyme you should not take Teysuno. If you have a reduced enzyme activity (partial deficiency) your doctor might prescribe a reduced dose. If you have negative test results for DPD deficiency, severe and life-threatening side effects may still occur.

Children and adolescents
Teysuno is not recommended for children under 18 years of age.

Other medicines and Teysuno
Tell your doctor if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

You must not take brivudine (an anti-viral medicine for the treatment of shingles or chickenpox) at the same time as Teysuno treatment (including during any rest periods when you are not taking any Teysuno capsules).

If you have taken brivudine you must wait for at least 4 weeks after stopping brivudine before starting to take Teysuno. See also section "Do not take Teysuno".

Also, you need to be particularly careful if you are taking any of the following:

- other fluoropyrimidine based medicines such as the anti-fungal flucytosine. Teysuno cannot be substituted for other oral fluoropyrimidine medicines.
- inhibitors of the enzyme CYP2A6 which activates Teysuno such as tranlycypromine and methoxsalen
- folic acid (often used in chemotherapy with methotrexate)
- blood-thinning medicines: coumarin-derivative anticoagulants such as warfarin
- medicines for the treatment of seizures or tremors such as phenytoin
- medicines that treat gout such as allopurinol

Teysuno with food and drink
Teysuno should be taken at least one hour before or one hour after a meal.

– **Low platelet count** leading to an increased chance of bleeding

• If you have bleeding of the skin, mouth (caused by brushing teeth), nose, respiratory tract, stomach, gut, etc., **stop taking Teysuno and contact your doctor immediately.**

• To prevent bleeding, avoid hard work or strenuous sports so as to prevent injuries and bruises. Wear loose clothing to protect the skin. Brush your teeth and blow your nose gently.

– **Loss of appetite (anorexia)** can lead to weight loss and dehydration

• You may become dehydrated if you do not eat and/or drink enough water.

• If you become dehydrated you may have symptoms such as dry

mouth, weakness, dry skin, dizziness, cramping

• Try to eat frequent small meals. Avoid fatty and strong-smelling food. Even if you do not feel hungry, continue to eat as much as you can to maintain good nutrition.

• If you feel tired and have fever together with loss of appetite, contact your doctor immediately.

– **Nerve disorder:** you may feel numbness, tingling, pain, abnormal sensation, weak muscle, shaking, or movement difficulties.

– **Weakness and fatigue,** which could be side effects caused by other medicines.

Common side effects (may affect 1 to 10 in 100 people) include:

– **Nerve:** headache, dizziness, sleeplessness, changes in taste

– **Eye:** eye problems, increased or decreased tearing discomfort, vision problems, serious illness with blistering of the eyes.

– **Ear:** hearing problems, loss of hearing away of the surface "skin" of the eye (corneal erosion).

– **Blood vessels:** high or low blood pressure, blood clots in the leg and lung

– **Lung and nasal passages:** shortness of breath, cough

– **Gut and mouth:** dry mouth, sores in mouth, throat, and oesophagus, flatpops, abdominal pain, indigestion, stomach or bowel inflammation, perforation of the stomach, small intestine, and large bowel.

– **Liver:** yellow eyes and skin, changes in blood tests which show the way the liver is working,

– **Skin:** hair loss, itchiness, rash or dermatitis, skin reaction, dry skin, hand-and-foot reaction (pain, swelling and redness of hands and/or feet), pigmented skin patches

– **Kidney:** decreased urine volume, changes in blood tests which show the way the kidney is working, kidney impairment and failure

– **Other:** chills, weight decrease, swelling in specific areas and muscle bone pain

Uncommon side effects (may affect 1 to 10 in 1,000 people) include:

– **Mental:** seeing and hearing some things that are not there, personally change, unable to sit still, confusion, feeling of nervousness, depression, sexual dysfunction

– **Nerve:** voice disorder, inability to speak and understand words, memory problem, unsteady gait, balance problems, one sided body weakness, sleepiness, nerve inflammation, distorted sense of smell, brain dysfunction, fainting, loss of consciousness, stroke, seizures

– **Eye:** itchy and red eyes, allergic reactions in eyes, drooping

– **Ear:** vertigo, ear clogging, ear discomfort

– **Heart:** irregular or fast heart beat, chest pain, accumulation of excess fluid around the heart, heart attack, heart failure

– **Blood vessels:** inflammation of a vein, hot flush

– **Lung and nasal passages:** runny nose, voice disorder, nasal clogging, pharyngeal erythema, hay fever

– **Gut and mouth:** fluid in the abdomen, gastroesophageal reflux disease, increased salivary secretion, excessive burping and belching, lip inflammation, gastrointestinal disorder, oral pain, abnormal contractions of muscles of the oesophagus, blockage in the stomach and intestine, stomach ulcer, retroperitoneal fibrosis, teeth that crack or break easily, swallowing difficulty.

– **Skin:** loss of skin colour, peeling skin, excessive body hair, nail shrinkage, excessive sweating.

– **General:** general condition worsening, weight increase, redness and swelling at the injection site, cancer pain and bleeding, multiple organ failure

– **Changes in blood tests:** high blood sugar, high blood lipids, changes in blood clotting time, high blood cell counts, low or high protein level

– **Other:** frequent urination, blood in urine, neck pain, back pain, breast pain, muscle tightness or cramps, joint swelling, limb discomfort, muscle weakness, arthritis inflammation and pain

Rare side effects (may affect 1 to 10 in